

Liste streng geschützter Arten gemäß § 10 Abs. 2 Nr. 11 BNatSchG mit früheren bzw. aktuellen Vorkommen in Schleswig-Holstein unter Angabe typischer Habitate in Schleswig-Holstein (Stand: 11.11.2003).

[illegible]

	Schl.-Holst.	Deutschland	FFH-RL IV	EU-ArtSchVO	BArtSchVO	KT/KF/KW/KL	KN/KOg	KK	KD/KS	WB/WA/WE	WM/WL/WF	WO/WR	HW/HF/HG	FB	FF	FG	Fba/FFa	FT	FK/FW/FX	FS/FV	MH	NS	NR/NU	TH/TR	GM	GN/GF	GI	AA/AG	AB/AO	RH	SG	SV	SA	
Alpenstrandläufer <i>Calidris alpina</i>	1	1			●	+	X													+													BKS/TS; Salzgrünland an Nord-/Ostsee; NF, RD, PLÖ, OH	
Baumfalke <i>Falco subbuteo</i>	3	3		●						X	X	X	X					+	+	+	+	+	+	+	+	+			+	+		+	BKB/TS; Ne: v.a. hochstämmige, alte Buchen oder Kiefern	
Bekassine <i>Gallinago gallinago</i>	2	2			●										+			+	+	+	X	X	X			X							BKB/TS; Feuchtgrünland und Feuchtbrachen, Moore; verbreitet	
Bienenfresser <i>Merops apiaster</i>	?	2			●							+	+											+	+				+			X	BKS/TS; Vermehrungsgast; in unterschiedlichen Landesteilen	
Blaukehlchen <i>Luscinia svecica</i>	3	3			●					X							X	+	+	+		X	X			X		?	+			X	BKS/TS; v.a. strukturreiche Feuchtbiotope; v.a. in der Marsch	
Blauracke <i>Coracias garrulus</i>	0	1			●							X	X											+	+				+			+	BKS/TS; Ne: in B; halboffene Kulturlandschaft, lichte Wälder	
Brachpieper <i>Anthus campestris</i>	1	2			●							+	+											X	+				+			?	BKS/TS; trocken-warme (Pionier)-Biotope mit Singwarten, OD, HL	
Brandseeschwalbe <i>Sterna sandvicensis</i>	3	V			●	+			X																								BKS/TS; Ne: Inseln, Halligen, Nehrungshaken; v.a. Westküste	
Bruchwasserläufer <i>Tringa gareola</i>	0	0			●																X												BKS/TS; †?; Hochmoore mit Verlandungsvegetation u. Singwarten	
Doppelschnepfe <i>Gallinago media</i>	0	0			●																X	X	X			X							BKS/TS	
Drosselrohrsänger <i>Acrocephalus arundinaceus</i>	1	2			●														X	X			+										BKS/TS; große Altschilfbestände an Seen/Teichen; v.a. östl. Hügelland	
Eissturmvogel <i>Fulmarus glacialis</i>	R	R			●	+		X																									BKS/TS; nur auf Helgoland	
Eisvogel <i>Alcedo atthis</i>	3	V			●				X			+	+	X	X	+	X	+	X	X												X	BKS/TS; Ne: Abbruchkanten, v.a. im östl. Hügelland u. Altmoränenbereich	
Fischadler <i>Pandion haliaetus</i>	0	3		●					?	X	X								+	+													BKB/TS; †?; Wiederbesiedlung möglich; Brutzeitnachweise RD/IZ	
Flußregenpfeifer <i>Charadrius dubius</i>	*	*			●				X										X	X								?			?	X	BKB/TS; Ne: vegetationsarme Flächen; v.a. im Binnenland; verbreitet	
Flußseeschwalbe <i>Sterna hirundo</i>	*	*			●	+	X		X						X				+	X													BKB/TS; Ne: kurzrasige, kiesige Areale v.a. auf Inseln; Küsten, Seen	
Flußuferläufer <i>Actitis hypoleucos</i>	*	3			●		?								X																	X	BKB/TS; Ne: sporadischer Brutvogel; sandig-kiesige Flächen; u.a. OH, NF	
Goldregenpfeifer <i>Pluvialis apricaria</i>	0	1			●																X												BKB/TS; Moorflächen der Geest	
Grauammer <i>Emberiza calandra</i>	1	2			●							?	X											+			+						BKB/TS; reich strukturierte Agrarlandschaften; NF, HEI; OH, RZ	

	Schl.-Holst.	Deutschland	FFH-RL IV	EU-ArtSchVO	BArtSchVO	KT/KF/KW/KL	KN/KOg	KK	KD/KS	WB/WA/WE	WM/WL/WF	WO/WR	HW/HF/HG	FB	FF	FG	Fba/FFa	FT	FK/FW/FX	FS/FV	MH	NS	NR/NU	TH/TR	GM	GN/GF	GI	AA/AG	AB/AO	RH	SG	SV	SA	
Großer Brachvogel Numenius arquata	2	2		●	●																X	X				X								BKB/TS; Moore und Moorgrünland (inkl. –Brachen); v.a. in der Geest
Großtrappe Otis tarda	0	1		●																	?			?	?			X						BKB/TS; baumlose (Acker-)Landschaften; ehemals in der Geest
Grünspecht Picus viridis	2	*			●					X	X	X	X																?		X			BKB/TS; v.a. in mosaikartigen Landschaften, Dorfrandlagen; verbreitet
Habicht Accipiter gentilis	*	*		●						X	X	X	X																					BKB/TS; v.a. Wald/(Nadel-)Forst, Waldrandzone, Knicklandschaft
Haubenlerche Galerida cristata	1	3			●																									X		X		BKB/TS; v.a. Gewerbe- und Verkehrsflächen; zerstreut, selten
Heidelerche Lullula arborea	1	3			●							+	+											X				X						BKB/TS; v.a. windgeschützte Heiden und Trockenrasen; v.a. Geest
Kampfläufer Philomachus pugnax	1	1			●	+	X									+	+	+	+	+		?					?							BKB/TS; v.a. Vorland-, Marsch-, Niederungsgrünland; Nord-/Ostsee
Karmingimpel Carpodacus erythrinus	R	R			●				X		X	X	X																					BKB/TS; v.a. Gebüsche/Gehölze an der Ostseeküste
Kiebitz Vanellus vanellus	3	3			●																X	X				X	?	X						BKB/TS; Moore, extensiv genutzte Agrarlandschaft; verbreitet
Kleines Sumpfhuhn Porzana parva	?	1			●															X				X			?							BKB/TS; Vermehrungsgast; Altschilfbestände
Knäkente Anas querquedula	1	3		●												X			X	X	X	X												BKB/TS; Überschwemmungsflächen; zerstreut/selten
Kornweihe Circus cyaneus	1	1		●					X				+											X				?						BKB/TS; Ne: Dünen und Schilfröhrichte, z.T. Getreidefelder; Westküste
Kranich Grus grus	3	*		●						X	X		+						+	X	X	X	+			+								BKB/TS; Ne: v.a. Erlenbrüche, Moorrandbereiche, v.a. östl. Hügelland
Küstenseeschwalbe Sterna paradisaea	*	*			●	+	X		X																									BKB/TS; Ne: Dünen, Strandwälle, Salzgrünland; v.a. Inseln/Halligen
Lachseeschwalbe Gelochelidon nitotica	1	2			●	+	X								X				+		+	+				+								BKB/TS; Ne: schütterer, niedrige Vegetation, v.a. Elbvorländer
Löffler Platalea leucorodia	?	*		●		+	+		X										?	?			?											BKB/TS; z.Z. 2 Kolonien an der Westküste (Oland, Trischen)
Mäusebussard Buteo buteo	*	*		●						X	X	X	X								+	+	+	+	+	+	+	+		+	+	+	+	BKB/TS; Ne: Büsche, Bäume; halboffene Agrarlandschaften; häufig
Mittelspecht Dendrocopos medius	3	V			●					X	X		?																					BKB/TS; Buchen-, Eichen- und Erlenbruch- und Auwälder
Moorente Anthya nyroca	0	1		●															X	X														BKB/TS; †?; vegetationsreiche Fischteiche und Kleingewässer

	Schl.-Holst.	Deutschland	FFH-RL IV	EU-ArtSchVO	BArtSchVO	KT/KF/KW/KL	KN/KOg	KK	KD/KS	WB/WA/WE	WM/WL/WF	WO/WR	HW/HF/HG	FB	FF	FG	Fba/FFa	FT	FK/FW/FX	FS/FV	MH	NS	NR/NU	TH/TR	GM	GN/GF	GI	AA/AG	AB/AO	RH	SG	SV	SA		
Mornellregenpfeifer <i>Eudromias morinellus</i>	0	0			●																X			?									BKB/TS		
Ohrentaucher <i>Podiceps auritus</i>	R	R			●														X	X													BKB/TS; v.a. Fischteiche, Weiher; v.a. östl. Hügelland		
Ortolan <i>Emberiza hortulana</i>	1	2			●								X														X		X				BKB/TS; strukturreiche, offene Agrarlandschaft; nur RZ		
Papageientaucher <i>Fratercula arctica</i>	0	0			●	+		X																			X						BKB/TS; ehemals auf Helgoland		
Raubseeschwalbe <i>Sterna caspia</i>	0	1			●	+	X	X	X						+				+	+													BKB/TS		
Raubwürger <i>Lanius excubitor</i>	1	1			●							X	X								X	?		+	X					+			BKB/TS; strukturreiche Agrarlandschaft; Heide, Moore; nur Geest		
Rauhfußkauz <i>Aegolius funereus</i>	R	*		●							X	X	X																				BKB/TS; Altholzbestände, Nadel- und Mischwälder; zerstreut		
Rohrdommel <i>Botaurus stellaris</i>	3	1			●								+	+	+	+	+	X		X			X										BKB/TS; Verlandungszonen mit Schilf; v.a. östl. Hügelland, ETS-Region		
Rohrschwirl <i>Locustella luscinioides</i>	R	V			●								+							X		X	X							?			BKB/TS; v.a. überflutete Röhricht- und (Alt-)Schilfbestände; v.a. östl. Hügelland		
Rohrweihe <i>Circus aeruginosus</i>	*	*		●					+											X	X	X	X			+	?	?		?			BKB/TS; Ne: v.a. Schilfbestände (z.T. auch kleinflächig); verbreitet		
Rosenseeschwalbe <i>Sterna dougalli</i>	0	0			●	+	?		X																								BKB/TS; †?; Einzelnachweise an der Westküste (Amrum, Sylt, Föhr)		
Rothalstaucher <i>Podiceps grisegena</i>	*	V			●														X	X			X										BKB/TS; flache, z.T. verlandete Gewässer; v.a. östl. Hügelland		
Rotkopfwürger <i>Lanius senator</i>	0	1			●							X	X								?			+	?			?					BKB/TS; reich strukturierte Agrarlandschaften (Streuobstwiesen etc.)		
Rotmilan <i>Milvus milvus</i>	3	*		●						X	X	X	+											+	+	+				+			BKB/TS; Ne: Buchenaltholzbestände; verbreitet		
Rotschenkel <i>Tringa totanus</i>	3	3			●	+	X								+	+			+	+	+	X	X			X							BKB/TS; Ne: lückige, höherwüchsige Brachen, Grünland; v.a. Küsten		
Säbelschnäbler <i>Recurvirostra avosetta</i>	*	*			●	+	X								X				+	X								?					X	BKB/TS; Salzwiesen, Schlickwattbereiche; Küsten, Elbwatten	
Sandregenpfeifer <i>Charadrius hiaticula</i>	V	*			●	+			X																									X	BKB/TS; Ne: vegetationsarme Flächen; Strand/Küste, Spülfelder
Schilfrohrsänger <i>Acroceph. Schoenobaenus</i>	2	2			●				X					+	+	+	+		+	X		+	X			+								BKB/TS; u.a. feuchte Röhrichtbereiche, Hochstauden; verbreitet	
Schlangenadler <i>Circaetus gallicus</i>	0	*		●								X	X								+	+		+						+				BKB/TS; Ne: Bäume; reich strukturierte Landschaften	

	Schl.-Holst.	Deutschland	FFH-RL IV	EU-ArtSchVO	BArtSchVO	KT/KF/KW/KL	KN/KOg	KK	KD/KS	WB/WA/WE	WM/WL/WF	WO/WR	HW/HF/HG	FB	FF	FG	Fba/FFa	FT	FK/FW/FX	FS/FV	MH	NS	NR/NU	TH/TR	GM	GN/GF	GI	AA/AG	AB/AO	RH	SG	SV	SA	
Schleiereule <i>Tyto alba</i>	*	*		●								+	+											+	+	+			+	X			BKB/TS: typischer Kulturfolger (Ne: Dachböden etc.); verbreitet	
Schreiadler <i>Aquila pomarina</i>	0	2		●						X	X	X	X								+	+		?	+	+	?	+		?			BKB/TS; v.a. Bruch- und Feuchtwälder mit angrenzenden Feuchtwiesen; SL	
Schwarzhalstaucher <i>Podiceps nigricollis</i>	R	V			●													X	X														BKB/TS; flache Gewässer; nur östl. Hügelland	
Schwarzmilan <i>Milvus migrans</i>	1	*		●						X								+	+	X				?	+	+	?	+		?			BKB/TS; Ne: v.a. bewaldete Seeufer und Auwälder, Einzelnachweise	
Schwarzspecht <i>Dryocopus martinus</i>	*	*			●					X	X	X	X																				BKB; Wälder, v.a. Buchenaltholz in Nadelforsten; verbreitet	
Schwarzstirnwürger <i>Lanius minor</i>	0	0			●							X	X								?			+	?			+		+			BKB/TS; reich strukturiertes, (halb)- offenes Gelände	
Schwarzstorch <i>Ciconia nigra</i>	3	3		●						X	X	X	X	+	+	+		+	+	+	+	+			+	+							BKB/TS; Altholzparzellen in Laub-/ Mischwäldern	
Seedler <i>Haliaeetus albicilla</i>	3	3		●						X	X	X	X						+	+													BKB/TS; v.a. störungsarme Wälder an Gewässern, v.a. östl. Hügelland	
Seeregenpfeifer <i>Charadrius alexandrinus</i>	2	2			●	+	X		X																								BKB/TS; Dünen, Strände, Salzwiesen; nur Westküste	
Seggenrohrsänger <i>Acrocephalus paludicola</i>	0	1			●										+							X				X							BKB/TS; †?; Seggenwiesen in Flußniederungen; ggf. Ansiedlung in ETS-Region	
Sperber <i>Accipiter nisus</i>	*	*		●							X	X	X												+	+	+	+			?		BKB/TS; Nadel-/Mischwälder, Gehölze, Knicklandschaften; verbreitet/häufig	
Sperbergrasmücke <i>Sylvia nisoria</i>	2	*			●					X		X	X											+		+		+		+		+	+	BKB/TS; halboffene, wärmebegünstigte Landschaften; RZ/HL, RD/NF?
Steinadler <i>Aquila chrysaetos</i>	0	2		●						X	X	X	X																				BKB/TS; Ne: Wälder und Gehölze, v.a. im Ostseeküstenbereich	
Steinkauz <i>Athene noctua</i>	2	2		●									X											?	+	+	+	?			X		BKB/TS, offene Landschaften mit z.T. kurzrasigen Flächen; v.a. Geest, Bruten in Höhlen auch in Gebäuden	
Steinwälzer <i>Arenaria interpres</i>	R	R			●	?	X		X																								BKB/TS; Dünen, beweidetes Salzgrünland; Nordseeküste	
Stelzenläufer <i>Himantopus himantopus</i>	?	?			●	+	?		X											?												?	BKB/TS; einzelne Bruten bzw. Brutversuche; v.a. an der Westküste	
Sumpfohreule <i>Asio flammeus</i>	1	1		●					X											?	X	X	?			X			X				BKB/TS; u.a. Dünen, Hoch- und Niedermoore; v.a. Geest, Marsch	
Teichralle <i>Gallinula chloropus</i>	*	V			●												X		X	X													BKB/TS; breites Spektrum an Gewässern; verbreitet/häufig	

	Schl.-Holst.	Deutschland	FFH-RL IV	EU-ArtSchVO	BArtSchVO	KT/KF/KW/KL	KN/KOg	KK	KD/KS	WB/WA/WE	WM/WL/WF	WO/WR	HW/HF/HG	FB	FF	FG	Fba/FFa	FT	FK/FW/FX	FS/FV	MH	NS	NR/NU	TH/TR	GM	GN/GF	GI	AA/AG	AB/AO	RH	SG	SV	SA	
Trauerseeschwalbe <i>Chlidonias niger</i>	1	1		●											?	X	X	X	X	X	+	+			+	+							BKB/TS; u.a. Kleingewässer, Seen; v.a. Marschen/Westküste	
Tüpfelralle <i>Porzana porzana</i>	3	3		●											X	?			?	X		X	X			X							BKB/TS; größere Röhrichte, Seggen-/ Binsenbestände; zerstreut	
Turmfalke <i>Falco tinnunculus</i>	*	*		●								X	X	X										+	+	+	+	+		X	+	+	BKB/TS; strukturreiche Landschaften; verbreitet/häufig, Bruten in Höhlen auch in Gebäuden	
Turteltaube <i>Streptopelia turtur</i>	*	*		●							X	X	X												+		+	+		+	X			BKB/TS; Ne: v.a. Nadelforste/-gehölze; v.a. in der Geest
Uferschnepfe <i>Limosa limosa</i>	2	2		●		?															X				X								BKB/TS, v.a. Marsch- und Niederungsgrünland; v.a. Westküste	
Uferschwalbe <i>Riparia riparia</i>	*	3		●	+		X											+	+	+	?											X	BKB/TS; Abbaugruben, Steilufer an Küsten; verbreitet	
Uhu <i>Bubo bubo</i>	R	*		●					X	X	X	X									+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	X	X	BKB/TS; Ne: Wälder, Abbaugruben; verbreitet	
Wachtelkönig <i>Crex crex</i>	1	1		●															X	X	X	X				?	X	X					BKB/TS; u.a. Niedermoore, Brachen, z.T. Äcker; zerstreut; Bestandsschwankungen	
Waldkauz <i>Strix aluco</i>	*	*		●					X	X	X	X									+	+		+	+	+	+	+	+	+	+	+	BKB/TS; Ne: v.a. Wälder, Gehölze, Parks, z.T. Gärten; verbreitet/häufig, Bruten in Höhlen auch in Gebäuden	
Waldohreule <i>Asio otus</i>	*	*		●					X	X	X	X									+	+		+	+	+	+	+	X	+	X	+	BKB/TS; Ne: Gehölze, kleinere Wälder, Parks, Gärten; verbreitet/häufig	
Waldwässerläufer <i>Tringa ochropus</i>	3	*		●					X				+	+			+			X													BKB/TS; Bruch-, Auwälder, Waldhochmoore; zerstreut	
Wanderfalke <i>Falco peregrinus</i>	R	3		●				X		X	X	X									+			+	+	+	+	+		+		X	BKB/TS; Ne: Bäume, z.T. Seezeichen u.ä., Bodenbruten; nur Westküste	
Weißstorch <i>Ciconia ciconia</i>	1	3		●											+	+	+	+	+	+	+	+			+	+	+	+		+	X		BKB/TS; Ne: v.a. Nisthilfen im Siedlungsbereich; v.a. in der Geest	
Wendehals <i>Jynx torquilla</i>	R	2		●					X	?	X	X													+	+	+	+	+	+	X			BKB/TS; lichte Wälder, halboffene Landschaften mit einzelnen großen Bäumen, v.a. östl. Hügelland
Wespenbussard <i>Pernis apivorus</i>	*	*		●					X	X	X	+												+				+		+		+	+	BKB/TS; lichte Wälder; verbreitet
Wiedehopf <i>Upupa epops</i>	0	1		●					X	+	X	X												X	+	+	+	+				+	+	BKB/TS; lichte Wälder, halboffene Landschaften
Wiesenweihe <i>Circus pygargus</i>	2	1		●												+		+	+	+	X	X	X			X							BKB/TS; v.a. feuchte Niederungen, Sümpfe; v.a. Marsch/Westküste	

	Schl.-Holst.	Deutschland	FFH-RL IV	EU-ArtSchVO	BArtSchVO	KT/KF/KW/KL	KN/KOg	KK	KD/KS	WB/WA/WE	WM/WL/WF	WO/WR	HW/HF/HG	FB	FF	FG	Fba/FFa	FT	FK/FW/FX	FS/FV	MH	NS	NR/NU	TH/TR	GM	GN/GF	GI	AA/AG	AB/AO	RH	SG	SV	SA					
Ziegenmelker Caprimulgus europaeus	1	2			●						X	X	X											X									BKB/TS; lichte Kiefernwälder, Heiden, Sandtrockenrasen; nur Geest					
Zwergdommel Ixobrychus minutus	0	1			●										?		X	+	+	X		X	X										BKB/TS; †?; stehende Gewässer und Schilfbestände; früher RZ					
Zwergschnäpper Ficedula parva	R	*			●					X	X	X	?																				BKB/TS; unterholzreiche Laub- und Mischwälder; v.a. östl. Hügelland					
Zwergseeschwalbe Sterna albifrons	2	2			●	+	?		X										?														BKB/TS; Ne: vegetationslose Ufer, Sandbänke, Nord-/Ostseeküste					
Säugetiere, Achtung bei den Fledermäusen nur naturnahe Jagd- und Hauptlebensräume in der Tabelle erfasst, Hinweise auf Quartierpräferenz unter Anmerkungen																																						
Abendsegler Nyctalus noctula	*	3	●		●					X	X	X	X	+	+		+		+	+		+			+	X			X		X	+	+	BKB/TS; verbreitet/häufig; Sommerquartier: Baum- Kunsthöhlen; Winterquartiere: Baum- Kunsthöhlen und Gebäude (oberirdisch); große Homerange Wanderfähig-Migration				
Bechsteinfledermaus Myotis bechsteinii	3	3	●		●					X	X	X	X															X		+	+		BKB/TS; v.a. vorwiegend Laubwälder mit altem Baumbestand; selten; Sommerquartier: Baum- Kunsthöhlen; Winterquartiere: unterirdische Höhlen u. Gebäude evtl. Baumhöhlen; kleine Homerange					
Biber Castor fiber	?	3	●							X				X	X		X																BKB; bevorstehende Wiederbesiedlung; RZ (Einzelfunde)					
Birkenmaus Sicista betulina	1	2	●							X		+	+								X	X				X							BKB; sumpfige, moorige Wälder; Ökoton; Einzelfunde in Angeln					
Braunes Langohr Plecotus auritus	3	V	●		●					X	X	X	X	+	+	+	+	+	X									X	X	X	X	+	BKB/TS; meist selten; Sommerquartier: Baum- Kunsthöhlen sowie Gebäude; Winterquartiere: unterirdische Höhlen u. Gebäude; Pionierart; kleine Homerange					
Breitflügelfledermaus Eptesicus serotinus	V	V	●		●					+	+	X	X						+			+	+	X	X	X	+	+	X	X	X	X	+	BKB/TS; gebäudegebunden; verbreitet/häufig; Sommer und Winterquartier: In / an Gebäuden (oberirdisch); mittelgroße Homerange				

	Schl.-Holst.	Deutschland	FFH-RL IV	EU-ArtSchVO	BartSchVO	KT/KF/KW/KL	KN/KOg	KK	KD/KS	WB/WA/WE	WM/WL/WF	WO/WR	HW/HF/HG	FB	FF	FG	Fba/FFa	FT	FK/FW/FX	FS/FV	MH	NS	NR/NU	TH/TR	GM	GN/GF	GI	AA/AG	AB/AO	RH	SG	SV	SA	
Europäischer Nerz <i>Mustela lutreola</i>	0	0	●							X				X	X		X		X	X													BKB; ehemals an Flüssen und Seen in Ostholstein	
Fischotter <i>Lutra lutra</i>	1	1	●							X				X	X	+	X	+	X	X			+			X							BKB, häufig an Fischteichen; z.Z. v.a. RZ/HL, in Ausbreitung begriffen (u.a. PLÖ, OH, SE)	
Fransenfledermaus <i>Myotis nattereri</i>	3	3	●		●					X	X	X	X	+	+	+	+	+	+	+					X	X			X	+	X	+	+	BKB/TS; Sommerquartier: Baum- Kunsthöhlen in Laubwälder, naturfernen Forsten sowie Gebäuden; Winterquartiere: unterirdische Höhlen u. Gebäude; mittelgroße Homerange
Große Bartfledermaus <i>Myotis brandtii</i>	2	2	●		●					X	X	X	X	+	+	+	+	+	+	+		X	+		X	X	+		+	+	X	+	+	BKB/TS; Sommerquartier: In / an Gebäuden, Baumhöhlen; Winterquartiere: unterirdische Höhlen; wanderfähig; mittelgroße bis große Homerange
Großes Mausohr <i>Myotis myotis</i>	1	3	●		●					+	X	X	X											X	X	X			X	+	+		+	BKB/TS; wärmeliebende Art; vom aussterben bedroht, Sommerquartier: Gebäude; Winterquartiere: unterirdische Höhlen u. Gebäude, große Homerange
Haselmaus <i>Muscardinus avellanarius</i>	2	V	●								X	X	X																					BKB: unterholzreiche Laub-/ Mischwälder, Knicks; v.a. östl. Hügelland
Kleine Bartfledermaus <i>Myotis mystacinus</i>	G	3	●		●					X	X	X	X	+	+	+	+	+	+	+		+	+		X	X	+		+	+				BKB/TS; bislang nur RZ; Sommerquartier: Spalten in / an Gebäuden, Baumhöhlen; Winterquartiere: unterirdische Höhlen u. Gebäude, wanderfähig; mittelgroße bis große Homerange
Kleiner Abendsegler <i>Nyctalus leisleri</i>	2	G	●		●					X	X	X	X	+	+		+		+			+		+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	BKB/TS; wärmeliebende Art, Sommerquartier: Baum u. Kunsthöhlen; Winterquartiere: keine Überwinterer in SH; wanderfähig- Migration; große Homerange
Mückenfledermaus <i>Pipistrellus pygmaeus</i>	D	D	●		●					X	X	X	X	X	X	+	+	X	X	X		X	+		+	X	+	+	X	+	X	X	+	BKB/TS; überwiegend Jungmoränenlandschaft; dort häufig im Siedlungsbereich auch Wälder; Sommerquartier: Spalten in / an Gebäuden, Baum- und Kunsthöhlen; Winterquartiere: Gebäude oberirdisch; wanderfähig?; mittelgroße Homerange

	Schl.-Holst.	Deutschland	FFH-RL IV	EU-ArtSchVO	BartSchVO	KT/KF/KW/KL	KN/KOg	KK	KD/KS	WB/WA/WE	WM/WL/WF	WO/WR	HW/HF/HG	FB	FF	FG	Fba/FFa	FT	FK/FW/FX	FS/FV	MH	NS	NR/NU	TH/TR	GM	GN/GF	GI	AA/AG	AB/AO	RH	SG	SV	SA				
Rauhautfledermaus <i>Pipistrellus nathusii</i>	3	G	●		●					X	X	X	X	X	X	+	+	X	X	X		X	+		+	X	+	+	+	+	X	X	+	BKB/TS; Sommerquartier: Baum- Kunsthöhlen, Gebäude; Winterquartiere: nur sehr wenig bekannt, Baumspalten, Holz- lager; wanderfähig- Migration; große bis mittelgroße Homerange			
Schweinswal <i>Phocoena phocoena</i>	2	2	●	●		X																											TS; in Nord- und Ostsee; Reproduktion im Flachwasser				
Teichfledermaus <i>Myotis dasycneme</i>	G	G	●		●					X	?	?	X	X	X	X	X	+	+	X		+	+		+	X							+	BKB/TS; gewässerreichen Landschaften; Sommerquartier: Spalten in / an Gebäu- den, sehr selten Kunsthöhlen; Winter- quartiere: unterirdische Höhlen u. Gebäu- de, wanderfähig- Migration?; große Ho- merange			
Wasserfledermaus <i>Myotis daubertonii</i>	*	*	●		●					X	X	X	X	X	X	X	X		X	X		+	+		+	+							+	BKB/TS; in wasserreichen Waldgebieten; verbreitet/häufig; Sommerquartier: Baum- Kunsthöhlen, selten Spalten in / an Ge- bäuden, Winterquartier: unterirdische Höhlen u. Gebäude; mittelgroße Home- range			
Zweifarbfladermaus <i>Vespertilio murinus</i>	2	G	●		●							X	X	+	+	+	+	+	X	X		X	X		X	X	+	+	X	X	X	X	+	BKB/TS; v.a. in Städten und Dörfern, WoSt auf Dachböden; HL, PLÖ, HL, SE; Sommerquartier: Spalten in / an Gebäu- den, Winterquartier: oberirdisch Spalten in / an Gebäuden; mittelgroße bis große Homerange			
Zwergfledermaus <i>Pipistrellus pipistrellus</i>	D	*	●		●					+	X	X	X	+	+	+	+	+	X	X		X	X	+	X	X	+	+	X	X	X	X	+	BKB/TS; Status unbekannt (s.u.); häufig im Siedlungsbereich; Sommerquartier: Spalten in / an Gebäuden; Winterquartie- re: oberirdisch an Gebäuden; mittelgroße Homerange			
Reptilien																																					
Europ. Sumpfschildkröte <i>Emys orbicularis</i>	0	1	●							X							X		X	X				+					+			+	BKB/TS; †?; ggf. RZ, HL (Wakenitz, Schaalsee)				
Schlingnatter <i>Coronella austriaca</i>	1	2	●									X	X								X			X					X		X	X	BKB; vor allem in der Geest, häufig zu- sammen mit Zauneidechse				
Zauneidechse <i>Lacerta agilis</i>	2	3	●					X				X	X											X					X		X	X	BKB; fehlt in der Marsch; auf Sandböden und an Gleisanlagen				

[illegible]

	Schl.-Holst.	Deutschland	FFH-RL IV	EU-ArtSchVO	BArtSchVO	KT/KF/KW/KL	KN/KOg	KK	KD/KS	WB/WA/WE	WM/WL/WF	WO/WR	HW/HF/HG	FB	FF	FG	Fba/FFa	FT	FK/FW/FX	FS/FV	MH	NS	NR/NU	TH/TR	GM	GN/GF	GI	AA/AG	AB/AO	RH	SG	SV	SA				
Asiatische Keiljungfer <i>Gomphus flavipes</i>	I	G	●										+		X																		BKB; La: leicht schlammige bis sandige Ufer; sporadisch RZ (Elbe)				
Große Moosjungfer <i>Leucorrhinia pectoralis</i>	2	2	●							X	+	+	+					X	X		X	X											?	BKB; La: eu- bis mesotrophe, saure Stillgewässer, v.a. OD, RZ			
Grüne Keiljungfer <i>Ophiogomphus cecilia</i>	0	2	●									+	+		X	X																		BKB; La: sauerstoffreiche, sandig-kiesige Fließgewässer; RZ, Einzelnachweis RD			
Grüne Mosaikjungfer <i>Aeshna viridis</i>	2	1	●									+	+			X	X	X	X	X														?	BKB; La: in Gewässer mit Krebschere (<i>Stratiotes aloides</i>) auch Garten- und Dorfteiche		
Hauben-Azurjungfer <i>Coenagrion armatum</i>	1	1		●															X		X	?												BKB; La: Zwischen- und Heidemoorweiher, v.a. NF, SL			
Helm-Azurjungfer <i>Coenagrion mercuriale</i>	0	1		●								+	+	X		X																		BKB; La: v.a. krautreiche, wärmebegünstigte Gewässer; RZ			
Hochmoor-Mosaikjungfer <i>Aeshna subarctica</i>	1	1		●							+	+							X		X													BKB; La: flutende Sphagnenrasen, häufig in größeren Gewässern			
Östliche Moosjungfer <i>Leucorrhinia albifrons</i>	0	1	●							+	+	+							X	X	X	?												BKB; La: dystrophe Waldgewässer, Waldhochmoore; RZ			
Späte Adonislibelle <i>Ceragrion tenellum</i>	0	1		●								+							X	X	X	X	?											?	BKB; La: v.a. dystrophe Hochmoore, Hangquellmoore; RZ		
Sibirische Winterlibelle <i>Sympecma paedisca</i>	I	2	●									+							X	X	X		X	X			X							?	BKB; La: v.a. in Niedermooren und an Seeufern; v.a. mittlere Geest		
Zierliche Moosjungfer <i>Leucorrhinia caudalis</i>	0	1	●							+	+	+					?		X	X	X													BKB; †?; La: v.a. dystrophe Waldgewässer; ehemals bei Lübeck; RZ?			
Zwerglibelle <i>Nehalennia speciosa</i>	0	1		●									+						X	X	X		X	X			X							?	BKB; La: Verlandungszonen oligotropher Gewässern; OD, HL		
Schmetterlinge																																					
Augsburger Bär <i>Pericallia matronula</i>	0	1		●						X	X	X																						BKB; †?; feucht-warme, gebüschreiche Wälder, RZ?			
Bartflechten-Baumspanner <i>Alcis jubata</i>	E	1		●							X	?																						BKB; in Nadelwäldern, ggf. auch andere Waldtypen			
Bruchweidenkarmin <i>Catocala pacta</i>	0	0		●						X		X									X	X												BKB; †?; Moorwälder			
Eisenfarbener Samtfalter <i>Hipparchia statilinus</i>	0	1		●					?															X						?				BKB; †?; nährstoffarme, trockene Standorte, u.a. Sandtrockenrasen			
Eschen-Scheckenfalter <i>Euphydryas maturna</i>	0	1	●							X		X	X																						BKB; feucht-warme Wälder		
Gagelstrauch-Moor-Holzeule <i>Lithophane lamda</i>	1	1		●						X											X														BKB; Moorwälder, Hochmoore, Feuchtheiden		

	Schl.-Holst.	Deutschland	FFH-RL IV	EU-ArtSchVO	BArtSchVO	KT/KF/KW/KL	KN/Kog	KK	KD/KS	WB/WA/WE	WM/WL/WF	WO/WR	HW/HF/HG	FB	FF	FG	Fba/FFa	FT	FK/FW/FX	FS/FV	MH	NS	NR/NU	TH/TR	GM	GN/GF	GI	AA/AG	AB/AO	RH	SG	SV	SA	
Wellenstriemenspanner <i>Scotopteryx coarctaria</i>	0	1			●						X	X	X											X					?				BKB; †?; Besenginsterheiden, warme, lichte Gehölze	
Graubraune Eichenbuscheule <i>Spudaea ruticilla</i>	0	1			●						X	X	X																				BKB; †?; in Eichen-Mischwäldern ?	
Rindenflechten-Spanner <i>Cleorodes lichenaria</i>	1	1			●				?		X	X	X																				BKB; wärmeliebend; RZ?	
Heide-Bürstenspanner <i>Orgyia antiquiodes</i>	1	1			●								+								X			X									BKB; tyrphophile Art	
Heidekraut-Fleckenspanner <i>Dyscia fagaria</i>	1	1			●				?				+											X									BKB; Heide, Dünen, trockenheits-/ wär-meliebend	
Heidekraut-Glattrückeneule <i>Aporophila lueneburgensis</i>	1	1			●				?				?								?			X									BKS; Dünen, Sandtrockenrasen, Feucht-heiden;	
Helle Pfeifengras-Büscheleule <i>Eremobina pabulatricula</i>	0	1			●					?	X	?	?																				BKB, †?; Laubwälder; thermophil	
Hofdame <i>Hyphoraia aulica</i>	0	1			●				?				?											X									BKB, †?; Heiden, Trockenrasen, Dünen; xerophil	
Kleiner Waldportier <i>Hipparchia alcyone</i> (= hermione)	0	1			●						+	+	+											X					?				BKB; †?; Kiefernwälder/-säume mit Tro-ckenrasen und Heiden	
Moorbunteule <i>Anarta cordigera</i>	0	1			●					X			?								X												BKB; †?; Hochmoore, Moorwälder, tyrp-hobiont	
Moosbeeren-Grauspanner <i>Carsia sororiata</i>	0	1			●								?								X												BKB; †?; Hochmoore, tyrphobiont	
Nachtkerzenschwärmer <i>Proserpinus proserpina</i>	A	V	●										X								?			X					?				BKB; Heiden, Trockenrasen, Gebüsche; thermophil	
Olivbraune Steineule <i>Polymixis polymita</i>	G	1			●								X																X				BKB; Gebüschformationen, Ruderalfluren	
Östlicher Großer Fuchs <i>Nymphalis xanthomelas</i>	E	0			●					X	X	X	X																?	?		?	BKB/TS; Standorte mit Weiden	
Quendel-Ameisenbläuling <i>Maculinea arion</i>	0	2	●																					X									BKB; †?; trockenwarme, lückige Rasen mit <i>Myrmica sabuleti</i> und <i>Thymus</i> spp.	
Baumspanner <i>Fagivorina arenaria</i>	0	1			●						X																							BKB; †?; Bruchwälder
Rußspinner <i>Parocneria detrita</i>	0	1			●						X	X	X											X					?				BKB; †?; Sandheide, Eichengebüsche	
Schrägflügel-Striemeneule <i>Simyra nervosa</i>	E	1			●							?												X					?				BKB; Heiden und Trockenrasen	
Schwärzliche Erdeule <i>Euxoa lidia</i>	0	0			●						X	X	X											X					?				BKB; †?; Sandheide, Eichengebüsche	

	Schl.-Holst.	Deutschland	FFH-RL IV	EU-ArtSchVO	BArtSchVO	KT/KF/KW/KL	KN/KOg	KK	KD/KS	WB/WA/WE	WM/WL/WF	WO/WR	HW/HF/HG	FB	FF	FG	Fba/FFa	FT	FK/FW/FX	FS/FV	MH	NS	NR/NU	TH/TR	GM	GN/GF	GI	AA/AG	AB/AO	RH	SG	SV	SA				
Kleinspanner Scopula decorata	E	1			●																			X									BKB; Heiden und Trockenrasen				
Sonneneule Heliothis maritima warneckei	R	1			●				X																								BKB; Küstenheiden; Westküste				
Weidenglucke Phyllodesma ilicifolia	R	1			●						X													X									BKB; Nadelwälder, Heiden, thermophil				
Spinnentiere																																					
Strand-Wolfsspinne Arctosa cineria	1	1			●				X															?								?	Einzelnachweise im Küstenbereich				
Krebse																																					
Edelkrebs Astacus astacus		?			●									X					+	X													Heute v.a. in Oberläufen von naturnahen Fließgewässern				
Kiemenfußkrebs Tanyastix stagnalis		1			●				X	X								X															†?; Dünetümpel (Sylt), ggf. Auwaldtümpel, Qualmässer (RZ)				
Weichtiere																																					
Abgeplattete Teichmuschel Pseudantodonta complanata	1	1			●										X					X													in ruhigen Strombuchten und in Seen, v.a. östl. Hügelland				
Gemeine Flussmuschel Unio crassus	1	1	●											X	+																		in klaren Bächen und Flüssen				

Erklärung

Spalten 2-6

RL: Rote Liste
FFH-RL IV: Im Anhang IV der FFH-Richtlinie
EU-ArtSch-VO: EGF (VO) 338/97, Anhang A
BArtSchG: Bundesartenschutzverordnung, streng geschützt

Spalte 7-34

KT: offenes Meeresgebiet
KF: Flachwasserzonen
KW: Watt
KL: Windwatt
KN: Salzwiesen (Nordsee)
Kog: Salzgrünland (Ostsee)
KK: Fels- und Steilküste
KD: Küstendünen
KS: Strand (inkl. Block, Geröll etc.)
WB: Bruchwald
WA: Auenwald
WE: Sumpfwald
WM: Mesophytische Buchenwälder
WL: Bodensaure Wälder
WF: Sonstige Laub-, Nadel- und Mischwälder
WO: Waldlichtungsflur
WR: Waldrand
HW: Wallhecken
HF: Feldhecken
HG: Sonstige Feldgehölze und Baumgruppen
FB: Bach
FF: Fluß
Fba: Bach-Altwasser
FFa: Fluss-Altwasser
FG: Künstliche Fließgewässer/Gräben
FT: Tümpel
FK: Kleingewässer
FW: Weiher (natürlich, naturgeprägt)
FX: künstliche oder überprägte Stillgewässer
FS: Seen (offene Wasserfläche)

FV: Verlandungsbereiche
MH: Hoch- und Übergangsmoore
NS: gehölzfreie Niedermoore, Sümpfe
NR: Landröhricht
NU: Uferstaudenflur
TH: Zwergstrauchheiden
TR: Mager- und Trockenrasen
GM: mesophiles Grünland
GN: seggen- und binsenreiche Naßwiese
GF: sonstiges artenreiches Feuchtgrünland
GI: artenarmes Intensivgrünland
AA: Acker
AG: Gartenbaufläche
AB: Baumschule
AO: Obstplantage
RH: Ruderalflur
SG: Garten- und Friedhofsanlagen
SV: Verkehrsanlagen (Gleisanlagen, Dämme etc.)
SA: Abgrabungs- und Aufschüttungsflächen
X: (Teil-)Habitat

+: weiteres Teilhabitat (nur im Kontext mit „X“)

Spalte 35

BKB: Biotopkomplexbesiedler
TS: Teilsiedler
ETS: Eider-Treene-Sorge
NF: Kreis Nordfriesland
RZ: Kreis Herzogtum Lauenburg
HL: Hansestadt Lübeck
OD: Kreis Stormarn
SL: Schleswig-Flensburg
†?: ggf. noch Vorkommen vorhanden
Ne: Nest/Brutplatz
Q: Quartiere
B: in Bäumen
G: in Gebäuden/Höhlen
an: anadrome Art
LP: Laichplatz
Im: Imago
La: Larve